

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-3-7-80699211

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.41.42

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 12 - 2 juillet 1980

: V I G N E :
: :
:

EUDEMIS :

Le second vol s'est amplifié dans les situations précoces depuis quelques jours, notamment dans le Gard (St Gilles, Vauvert, Gallician, Franquevaux), dans l'Hérault (Aspiran, Paulhan, Montpellier, Méjanelle, zone de muscat) et dans le Narbonnais. Les pontes demeurent faibles pour l'instant dans les autres situations, Lunel, Perpignan, Carcassonne, Vaunage.

A la suite des attaques certes localisées mais importantes, survenues à la fin mai dans la plaine héraultaise et en Costières, la plus grande vigilance doit être apportée actuellement au repérage des pontes et à leur évolution. Les blessures causées aux grappes par les chenilles de cette génération sont souvent à l'origine de foyers de pourriture (Botrytis). La lutte devra être modulée plus particulièrement cette année, selon les situations.

En vue d'éviter une activité toujours dommageable dans les situations fréquentées par l'Eudemis, une protection est à mettre en place à partir du 4 juillet en tenant compte des propriétés des différents insecticides autorisés à la vente contre ce ravageur.

Les pyrethrinoides sont à employer dès le constat des premières pontes (cyperméthrine, dècaméthrine, fenvalérate, perméthrine).

Les insecticides semi-préventifs, comme acéphate, azinphos, bromophos, carbaryl, fénitrothion, malathion, méthidathion, méthomyl, phosalone, tétrachlorvinphos pourront être utilisés dès le début de l'éclosion des oeufs, attendu autour du 8 juillet.

Enfin les produits de type parathion sont utilisables dès la constatation des toutes premières pénétrations.

Cette première intervention pourra être suivie en cas de découverte de chenilles par une 2ème pulvérisation à l'aide de parathion auquel on aura soin d'ajouter un acaricide.

Il est nécessaire de bien pénétrer les grappes. Les résultats obtenus seront fonction de la qualité de la pulvérisation réalisée. La meilleure efficacité est obtenue avec les appareils à flux d'air.

P. 366

On pourra recourir à la réalisation de poudrages (plus spécialement pour la 2ème application) si les attaques se prolongent.

Un prochain bulletin fera à nouveau le point.

COCHYLIS - EULIA

L'activité de ces ravageurs est en recrudescence dans la zone littorale. Des attaques ont été observées fin mai dans certains tènements.

:	ARBORICULTURE	FRUITIERE	:
:			:

MINEUSES des FEUILLES

De fortes attaques de "mineuses cerclées" sont observées dans la région du Vigan (30). Le dépôt de pontes du 2ème vol a été repéré. Aussi le traitement à l'aide de diflubenzuron (Dimilin) doit être appliqué assez rapidement. Lors de la découverte des premiers dégâts, on peut recourir aux produits efficaces contre le Carpocapse, mais en ayant le soin de traiter l'ensemble de la végétation.

Dans la région de Nîmes, la présence d'autres mineuses est signalée. Le traitement contre le Carpocapse devrait entraver les attaques de ces ravageurs.

:	MAÏS - SEMENCE	:
:		:

TRAITEMENT contre la PYRALE

Les captures à l'aide de pièges sexuels, ont permis de mettre en évidence l'activité de ce ravageur. De très jeunes chenilles ont été repérées dès le milieu de la semaine dernière (23 - 25 juin).

Une application insecticide est recommandée.

Généralement conseillé à l'époque où la plante est la plus réceptive : 50 % des épis mâles dans le cornet, le traitement à base de microgranulés devra être effectué un peu plus tôt, du fait des conditions climatiques actuelles et du cycle du ravageur.

N.B - D'autres chenilles d'âge différent sont également présentes : il s'agit de sésamies.

1'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE
CHEF DE CIRCONSCRIPTION,

V. LAGAUE

Tirage du 2 juillet 1980 - 1200 exemplaires.